



www.dialab.at

GEBRAUCHSANWEISUNG / DEUTSCH

PACKUNGSINHALT

- Schwangerschaftstest
- Gebrauchsanweisung

TESTPRINZIPIUM

Der DIALAB Schwangerschaftstest ist ein „lateral flow“ Immunassay. Der Teststreifen für den qualitativen Nachweis von schwangeren Chorion-Gonadotropin (hCG) im Urin zur Erkennung einer Schwangerschaft. Für die Testung wird eine Kombination aus Antikörpern (inklusive eines monoklonalen hCG-Antikörpers) verwendet, um selektiv erhöhte hCG-Spiegel zu ermitteln. Für die Testdurchführung wird das untere Ende des Teststreifens in den Urin eingetaucht. Das Ergebnis wird visuell durch das Ablesen von gefärbten Linien ermittelt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor der Testdurchführung die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

- Nicht nach Ablauf des auf dem Beutel aufgedruckten Halbtägertestsdatums verwenden.
- Bei 2-30°C trocken lagern, nicht einfrieren.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel aufgerissen oder beschädigt ist.
- Von Kindern fernhalten.
- Nur zur In-vitro-Diagnostik für die Eigenanwendung, Nicht einnehmen.
- Den Folienbeutel erst kurz vor Testbeginn öffnen.
- Der benutzte Test ist gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Sammeln Sie Urin in einem sauberen und trockenen Becher oder Behälter.

2. Nehmen Sie den Teststreifen aus dem Folienbeutel und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut.

3. Tauchen Sie den Teststreifen mit den Pfeilen voran für mindestens 10-15 Sekunden in die Urinpipette, wobei der Teststreifen nicht tiefer als bis zur Maximal-Markierung (MAX) in den Teststreifen in die Urinpipette eingetaucht werden darf (siehe Abbildung unten).

4. Nehmen Sie den Teststreifen aus dem Urin heraus, legen Sie ihn auf eine nicht-saftige, ebene Fläche und beginnen Sie mit der Zeitmessung.

5. Wenn der Test zu arbeiten beginnt, können Sie eine schwach positive Reaktion (eine schwache horizontale Linie in der Kontrolllinien-Bereich (C)) des Teststreifens hinbekommen. Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab. Wenn keine farbige Linie erscheint, warten Sie noch eine Minute länger. Eine positive Ergebnisse können je nach hCG-Konzentration bereits nach 1 Minute oder früher beobachtet werden. Lesen Sie das Ergebnis nicht nach mehr als 10 Minuten ab.

ABLESEN DER ERGEBNISSE

SCHWANGER

Zwei horizontale farbige Linien erscheinen. Eine Linie sollte sich im Kontrolllinien-Bereich (C) befinden und eine andere Linie sollte sich im Testlinien-Bereich (T) befinden. Es ist möglich, dass eine Linie schwärzlich ist als die andere: sie müssen nicht übereinstimmen. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.

NICHT SCHWANGER

Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinien-Bereich (C). Es erscheint keine Linie im Testlinien-Bereich (T). Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind.


UNGÜLTIG

Das Ergebnis ist ungültig, wenn keine farbige Linie im Kontrolllinienbereich (C) erscheint, selbst wenn eine Linie im Testlinienbereich (T) erscheint. Sie sollten den Test mit einem neuen Teststreifen wiederholen.

EINSCHRÄNKUNGEN

Es kann vorkommen, dass dieser Test ein falsches Ergebnis ergibt. Suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor weitere Entscheidungen medizinischer Art getroffen werden.

- Medikamente, die hCG enthalten (wie z. B. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APU) können zu einem falsch-positiven Ergebnis führen. Alkohol, Antibabypille, Schmerzmittel, Antibiotika oder Hormontherapien, die kein hCG enthalten, sollten das Testergebnis nicht beeinflussen.



DIALAB Schwangerschaftstest
Zur Eigenanwendung

REF Z02305DL

CE 0408

2. Außer einer Schwangerschaft können einige Erkrankungen (z.B. Eierstockzysten oder extraterritoriale Schwangerschaften) erhöhte hCG-Spiegel verursachen, die zu einem falsch-positiven Ergebnis führen können.

FRAGEN UND ANTWORTEN

- F: Wie funktioniert der Test?
A: Der DIALAB Schwangerschaftstest weist ein Hormon im Urin nach, das der Körper während der Schwangerschaft produziert (hCG - Human Chorion Gonadotropin). Die Menge des Schwangerschaftshormons steigt im Verlauf der Schwangerschaft an.
- F: Ab wann kann der Schwangerschaftstest durchgeführt werden?
A: Der Test kann ab dem ersten Tag nach Ausbleiben der Periode durchgeführt werden. Test kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. Bei einer Schwangerschaft erhält jedoch der erste Morgenurin die höchste Konzentration des Schwangerschaftshormons.

3. F: Welche der ersten Morgenurin verwendet werden?

A: Obwohl der Test zu jeder Tageszeit durchgeführt werden kann, ist der erste Morgenurin normalerweise besonders konzentriert und enthält am meisten hCG.

4. F: Wie genau ist der Test?
A: Ein Mindeste Studie wurde durchgeführt, in der die Ergebnisse des DIALAB Schwangerschaftstests mit einem anderen kommerziell erhältlichen hCG-Membran-Test verglichen wurden. Die klinische Laienstudie umfasste 140 Urinproben. Beide Testverfahren erkannten 80 positive und 60 negative Ergebnisse. Die Ergebnisse, die mit dem DIALAB Schwangerschaftstest erzielt wurden, waren einer Membran-Test vergleichbar über 99% im Vergleich zu einem anderen hCG-Membran-Test.5. F: Wie empfindlich ist der Test?
A: Der DIALAB Schwangerschaftstest weist hCG im Urin ab einer Konzentration von 25 mU/ml oder mehr nach. Der Test wird mit einem International Standard (Referenzwert der WHO) standardisiert. Die Zugabe von LH (300 mU/ml), FSH (1.000 mU/ml) und TSH (1.000 mU/ml) zu negativen (0 mU/ml hCG), FSH (1.000 mU/ml) und positiven (25 mU/ml hCG) Proben zeigte keine Kreuzreaktion.6. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis eine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.7. F: Woher weiß ich, ob der Test richtig funktioniert hat?
A: Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrolllinienbereich (C) sagt aus, dass der Test korrekt durchgeführt wurde und die richtige Menge Urin aufgesaugt wurde.8. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.9. F: Woher weiß ich, ob der Test richtig funktioniert hat?
A: Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrolllinienbereich (C) sagt aus, dass der Test korrekt durchgeführt wurde und die richtige Menge Urin aufgesaugt wurde.10. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.11. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.12. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.13. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.14. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.15. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.16. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.17. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.18. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.19. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.20. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.21. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.22. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.23. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.24. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.25. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.26. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.27. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.28. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.29. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.30. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.31. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.32. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.33. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.34. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.35. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.36. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.37. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.38. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.39. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.40. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.41. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.42. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.43. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.44. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.45. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.46. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.47. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.48. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.49. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.50. F: Wie verhält mich, wenn das Ergebnis keine Schwangerschaft anzeigen?
A: Es bedeutet, dass Ihr hCG enthalt und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie einen Arzt auf um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen.

DIALAB
www.dialab.at

Mode d'emploi / FRENCH

CONTENU

- Bandelette
- Mode d'emploi

PRINCIPE

Le DIALAB test de grossesse est un test rapide immunologique en 1 étape en forme de bandelette qui permet la détection qualitative de l'hormone Chorionique Gonadotrope humaine (hCG) dans l'urine. Le test détecte l'hormone hCG dans l'urine à l'aide d'un anticorps monoclonal anti-hCG, qui permet la détection d'un taux élevé d'hCG. Le principe consiste à plonger la bandelette dans l'échantillon d'urine et lire les résultats obtenus à travers les lignes colorées.

PRÉCAUTIONS

Lire toutes les informations sur ce mode d'emploi avant d'effectuer le test.

- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le sachet aluminium.
- Conserver dans un endroit sec à 2-30°C ou 36-86°F. Ne pas congeler.

DÉMARRAGE

Legger legermente le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso prima di eseguire il test.

- Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla busta di alluminio.
- Conservare in un luogo asciutto a 2-30°C o 36-86°F. Non congelare.
- Utilizzare se la busta è aperta e danneggiata.
- Conservare lontano dalla portata dei bambini.
- Solo per uso diagnostico in vitro. Non per uso interno.
- Non aprire la busta in alluminio fino a quando non si è pronti per eseguire il test.
- Dopo l'uso, rimuovere immediatamente la striscia.

TEST

Il DIALAB test de grossesse permet de détecter la présence d'hCG dans un taux de 25 mU/ml. Ce test a été standardisé au niveau MAX (indiqué par la ligne (MAX)) et de TSH (1.000 mU/ml), FSH (1.000 mU/ml) et de LH (300 mU/ml).

4. Q: Quel est le degré de précision du test?
R: Une étude clinique a été menée pour comparer les résultats obtenus avec le Test de Détection Précoce de la Grossesse en 1 Etape contre un autre test d'urine d'hCG commercialisé. L'évaluation clinique pour consommateur porte sur 140 échantillons d'urine: les deux tests identifient 80 résultats positifs et 60 négatifs. Les résultats démontrent une exactitude générale de plus de 99%. Le test de Détection Précoce de la Grossesse en 1 Etape compare aux autres tests d'urine d'hCG.

5. Q: Quel est le degré de sensibilité du test?
R: Le DIALAB test de grossesse permet de détecter la présence d'hCG dans l'urine pendant au moins 10-15 secondes, flèches pointant vers le bas. Ne pas immerger la bandelette au-delà de la ligne maximum (MAX).

6. Q: Quel est le degré de sensibilité du test?
R: Bien que le test puisse être fait à n'importe quel moment de la journée, les premières urines sont souvent les plus concentrées de la journée et contiennent le plus de hCG.

7. Q: Comment puis-je savoir que le test a fonctionné normalement?
R: L'apparition d'une ligne dans la zone de contrôle (C) indique que le mode d'emploi a été suivi correctement avec une quantité de urine suffisante.

8. Q: Que dois-je faire si le résultat indique que je suis enceinte?
R: Cela indique qu'aucune trace d'hCG n'a été détectée dans vos urines et que vous n'êtes pas enceinte. Si les règles ne reviennent pas d'après une semaine, refaire le test avec une nouvelle bandelette. Si le même résultat négatif est obtenu et les règles ne viennent toujours pas, consulter le médecin traitant.

Il est conseillé de suivre les démarches suivantes pour avoir une grossesse saine et un bébé en bonne santé:

1. Utiliser le DIALAB test de grossesse dès qu'un retard de règles est observé. La connaissance précoce de la grossesse entraîne de meilleurs soins prématernels.

2. Si un résultat positif est obtenu, consulter le médecin traitant sans tarder pour commencer le soin prénatal.

3. Observer un régime alimentaire équilibré, arrêter de fumer et limiter sa consommation d'alcool.

NON VALIDO
Il risultato è da considerarsi non valido se non appare nessuna linea nella zona del controllo (C), anche se appare una linea nella zona del test (T). Se entro una settimana non si presenta, ripetere il test con una nuova striscia reattiva. Se il risultato è ancora negativo ma il ciclo non si presenta, contattare il proprio medico.

LIMITI
Il test potrebbe produrre dei risultati non corretti. Consultare il proprio medico prima di intraprendere ogni decisione medica.

1. Medicinali che contengono hCG (come Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) possono produrre risultati falsi positivi. Alcol, contraccettivi orali, antidiarolici, antibiotici o terapie ormonali che non contengono hCG non dovrebbero interferire con i risultati.

3. Mantenere una dieta ben bilanciata, smettere di fumare e ridurre l'assunzione di alcol.

DIALAB Test de grossesse à domicile
www.dialab.at

REF Z02305DL

CE 0408

ISTRUZIONI D'USO / ITALIANO

CONTENUTO DEL KIT

- Striscia reattiva
- Metodica

PRINCIPIO

Il DIALAB test di gravidanza è un test rapido, monofase immunoassorbitografico a flusso laterale, su striscia, per la determinazione qualitativa dell'gonadotropina coriicotropa umana (hCG) nell'urina al fine di diagnosticare una gravidanza. Il test utilizza una combinazione di anticorpi, compreso l'anticorpo monoclonale anti-hCG, per rilevare in maniera selettiva elevati livelli di hCG. Il test è seguito immediatamente della striscia immersa nell'urina.

2. D: Quanto tempo aspettare per fare il test da quando si è possibile essere in gravidanza?

R: Si può effettuare il test già dal primo giorno di ritardo del mestruo. Si può scegliere un qualsiasi momento della giornata, se si è in gravidanza.

3. D: Si deve utilizzare la prima urina del mattino?

R: Anche se il test può essere effettuato in qualsiasi momento della giornata, la prima urina del mattino è normalmente la più concentrata del giorno e dovrebbe contenere una maggiore quantità di hCG.

4. D: Quanto è accurato il test?

R: È stata svolta una valutazione clinica comparando i risultati ottenuti con il DIALAB test di gravidanza con un altro test su membrana per hCG. La valutazione clinica esterna comprendeva 140 campioni di urina; entrambi i kit hanno prodotto 80 risultati positivi e 60 negativi. I risultati hanno rilevato un'accuratezza totale del 99,4% di gravidanza.

5. D: Quanto è sensibile il test?

R: Il test di gravidanza determina la presenza di hCG nell'urina ad una concentrazione uguale o superiore a 25 mU/ml. Il test è stato standardizzato con l'WHO International Standard. Aggiunta di LH (300 mU/ml), FSH (1.000 mU/ml) e TSH (1.000 mU/ml) a campioni negativi (0 mU/ml hCG) e positivi (25 mU/ml hCG) non ha rilevato cross-reactività.

6. D: Cosa fare se il risultato dimostra che si è in stato di gravidanza?

R: Significa che le urine contengono hCG e che probabilmente si è stato di gravidanza. Contattare il proprio medico per accettare lo stato di gravidanza e discuterne con lui i passi successivi.

7. D: Come sapere se il test è stato eseguito correttamente?

R: La comparsa di una linea colorata nella zona di controllo (C) indica che la procedura è stata eseguita correttamente.

8. D: Cosa fare se il risultato dimostra che non si è in stato di gravidanza?

R: Significa che non urines contiene hCG e che probabilmente non si è in stato di gravidanza. Se entro una settimana non si presenta, ripetere il test con una nuova striscia reattiva.

9. D: Significato di seguire le indicazioni per aumentare la probabilità di una gravidanza regolare ed avere un bambino sano.

1. Utilizzare il DIALAB test di gravidanza per determinare la gravidanza quando il ciclo è in ritardo. Non appena si è a conoscenza della gravidanza, incominciare le cure prenatali.

2. Si ottiene un risultato positivo, quindi contattare il proprio



www.dialab.at

Package insert / ENGLISH

GB DIALAB Pregnancy Test
For Self Testing

REF Z02305DL

CE 0408

contraceptives, painkillers, antibiotics or hormone therapies that do not contain hCG should not affect the test result.

- A number of medical conditions other than pregnancy, including, ovarian cyst or ectopic pregnancy (pregnancy outside the uterus) can cause elevated levels of hCG, which can result in a false positive result.

QUESTIONS & ANSWERS**1. Q: When is the test work?**

A: The DIALAB Pregnancy Test detects a hormone in your urine that your body produces during pregnancy (hCG-human Chorionic Gonadotropin). The amount of pregnancy hormone increases as pregnancy progresses.

2. Q: How soon after I suspect that I am pregnant can I take the test?

A: You can test your urine as early as the first day you miss your period. You can perform the test anytime of the day; however, if you are pregnant, first morning urine contains the most pregnancy hormone.

3. Q: Do I have to test with first morning urine?

A: Although you can test at any time of the day, your first morning urine is usually the most concentrated of the day and would have the most hCG in it.

4. Q: How accurate is the test?

A: A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the DIALAB Pregnancy Test to another commercially available urine membrane hCG test. The consumer clinical trial included 140 urine specimens: both assays identified 80 positive and 60 negative results. The results demonstrated >99% overall accuracy of the DIALAB Pregnancy Test when compared to the other urine membrane hCG test.

5. Q: How sensitive is the test?

A: The DIALAB Pregnancy Test detects hCG in urine at a concentration of 25 mIU/mL or greater. The test has been standardized to WHO International Standard. The addition of LH (300 mIU/mL), FSH (1,000 mIU/mL), and TSH (1,000 mIU/mL) to negative (0 mIU/mL) hCG and positive (25 mIU/mL hCG) specimens showed no cross-reactivity.

6. Q: What should I do if the result shows that I am pregnant?

A: It means that your urine contains hCG and you are probably pregnant. See your doctor to confirm that you are pregnant and to discuss the steps you should take.

7. Q: How do I know that the test was run properly?

A: The appearance of a colored line in the control line region (C) tells you that you followed the test procedure properly and the proper amount of urine was absorbed.

8. Q: What should I do if the result shows that I am not pregnant?

A: It means that no hCG has been detected in your urine and probably you are not pregnant. If you do not start your period within a week of its due date, repeat the test with a new test strip. If you receive the same result after repeating the test and you still do not get your period, you should see your doctor.

READING THE RESULTS**PREGNANT**

Two distinct colored lines appear. One line should be in the control line region (C) and another line should be in the test line region (T). One line may be lighter than the other; they do not have to match. This means that you are probably pregnant.

NOT PREGNANT

One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line region (T). This means that you are probably not pregnant.

INVALID

The result is invalid if no colored line appears in the control line region (C), even if a line appears in the test line region (T). You should repeat the test with a new test strip.

LIMITATIONS

There is the possibility that this test may produce false results. Consult your physician before taking any medical decisions.


1. Drugs which contain hCG (such as Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) can give a false positive result. Alcohol, oral

contraceptives, painkillers, antibiotics or hormone therapies that do not contain hCG should not affect the test result.

2. Use the DIALAB Pregnancy Test to detect pregnancy when your period is late. You can begin better prenatal care as soon as you learn of your pregnancy.

3. If you get a positive result, it is advisable to visit your doctor immediately to begin your prenatal care.

3. Maintain a well-balanced diet, stop smoking, and reduce your intake of alcohol.



www.dialab.at

Ficha Técnica / SPANISH

CONTENIDO DEL KIT

- Tira
- Ficha técnica

PRINCIPIO

La Detección Temprana de la DIALAB Prueba de Embarazo es un rápido ensayo inmunoenzimático de flujo lateral de uso solo en tiras para la detección cualitativa de Gonadotropina Coriónica humana (hCG) en orina como ayuda en la detección del embarazo. La prueba utiliza una combinación de anticuerpo induciendo un anticuerpo monoclonal hCG para selectivamente detectar niveles elevados de hCG en orina. El resultado se obtiene en el final de la tira cuando y obteniendo el resultado de acuerdo a las líneas coloreadas.

PRECAUCIONES

Favor de leer la información de este folleto antes de realizar la prueba.

- No utilizar después de la fecha de expiración impresa en el sobre laminado.
- Almacenar en un lugar seco a 2-30°C o 36-86°F. No congelar.
- No lo utilice si el sobre está dañado.
- No lo utilice si la fecha de vencimiento ha pasado.

Para diagnóstico in vitro únicamente. No debe ingerirse. No abre el sobre laminar hasta que este listo para realizar la prueba.

- La prueba, una vez utilizada, debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

INSTRUCCIONES

- Orina en un depósito seco y limpio.
- Retire la tira del sobre laminar y familiarícese con el procedimiento.

3. Vuelva las flechas apuntando hacia la orina, sumerja la tira verticalmente en la orina al menos entre 10 y 15 segundos. No pase la línea máxima (MAX) de la tira cuando sumerja la tira en la orina. Ver figura abajo.

4. Saque la tira de la orina, sumerja en una superficie plana no absorbente y seque con un cronómetro.

5. Cuando la prueba comienza a trabajar puede notar un flujo ligeramente rojo que se mueve a través de la región de la banda de la prueba (C) y la región de la banda de control (C) de la tira. Lea y resultados en tres minutos. Si no aparece la línea coloreada, espere otros minutos más. Algunos resultados positivos pueden ser visibles en un minuto o menor dependiendo de la concentración de hCG. No lea los resultados después de 10 minutos.

LECTURA DE LOS RESULTADOS**EMBARAZADA**

Dos líneas coloradas aparecen. Una línea debe estar en la región de la banda de control (C) y la otra línea debe estar en la región de la banda de la prueba (T). Una línea puede ser más débil que la otra, no tienen que ser iguales. Esto quiere decir que probablemente esté embarazada.

NO EMBARAZADA

Una línea aparece en la región de la banda de control (C). Ninguna línea aparece en la región de la banda de la prueba (T). Esto quiere decir que probablemente no esté embarazada.

NO VÁLIDA


El resultado es inválido si ninguna línea coloreada aparece en la región de la banda de control (C), aún cuando aparezca una línea en la región de la banda de la prueba (T). Debe repetir la prueba con una nueva prueba.

LIMITACIONES

Existe la posibilidad que esta prueba produzca falsos resultados. Consulte su médico antes de tomar alguna decisión médica.

1. Los resultados que contiene hCG (como Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) pueden dar como resultados falsos positivos. Alcohol, anticonceptivos orales, calmantes, antibióticos o terapias de hormonas que no contiene hCG no deben alterar los resultados de las pruebas.

2. Algunas condiciones médicas otras que embarazo, incluyendo,



www.dialab.at

Ficha Técnica / SPANISH

CONTENIDO DEL KIT

- Tira
- Ficha técnica

PREGUNTAS Y RESPUESTAS**1. P: ¿Cómo trabaja la prueba?**

R: La Detección Temprana de la DIALAB Prueba de Embarazo detecta una hormona en su orina que su cuerpo produce durante el embarazo (Gonadotropina Coriónica humana hCG). La cantidad de hormona en el embarazo se incrementa conforme el embarazo progresó.

2. P: ¿Cuánto tiempo después que sospecho que estoy embarazada puedo hacer esta prueba?

R: Puede hacer esta prueba tan pronto como comience a sentirse el efecto menstrual. Puede realizar una prueba en cualquier momento del día, sin embargo, se está mejor embarazada, la orina de la primera hora de la mañana contiene la mayor cantidad de la hormona del embarazo.

3. P: Tengo que hacer esta prueba con la primera orina de la mañana?

R: Aunque puede hacer esta prueba a cualquier hora de día, su primera orina de la mañana es la que usualmente esta más concentrada durante el día y contiene la mayor concentración de hCG en ella.

4. P: ¿Cuán exacta es la prueba?

R: Una evaluación clínica fue desarrollada comparando los resultados obtenidos utilizando la Detección Temprana de la DIALAB Prueba de Embarazo con otras pruebas de hCG orina membrana comercialmente disponibles. La prueba de consumo diario incluyó 140 especímenes en orina ambas pruebas identificaron 80 positivos y 60 resultados negativos. Los resultados demostraron >99% de exactitud con respecto a la Detección Temprana de la DIALAB Prueba de Embarazo cuando se compara a la otra de hCG de orina en membrana.

5. P: ¿Cuán sensible es la prueba?

R: La Detección Temprana de la DIALAB Prueba de Embarazo detecta concentraciones de hCG en orina de 25 mIU/ml o mayores. La prueba es considerada válida en la Organización Mundial de la Salud (OMS) Estándar Internacional. El agregado de LH (300 mIU/ml), FSH (1,000 mIU/ml), y TSH (1,000 µU/ml) para negativo (0 mIU/ml) hCG y positivo (25 mIU/ml hCG) especímenes mostraron que no había ninguna reacción cruzada.

6. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que estoy embarazada?

R: Quiere decir que su orina contiene hCG y que probablemente esté embarazada. Vea su doctor para que le confirme que esté embarazada y para discutir los pasos a seguir.

7. P: ¿Cómo puedo saber que la prueba ha sido realizada correctamente?

R: La aparición de una línea colorada en la región de la banda de control (C) le dice que usted ha seguido el procedimiento correctamente y que la cantidad de orina apropiada ha sido introducida.

8. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que no ha sido detectada la hormona hCG en su orina y probablemente no esté embarazada. Si no comienza su periodo dentro una semana después de la fecha indicada, repita la prueba con una nueva tira. Si obtiene el mismo resultado después de haber repetido la prueba y su periodo no comienza, debe ver al doctor.

9. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

10. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

11. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

12. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

13. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

14. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.

15. P: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?

R: Quiere decir que probablemente no esté embarazada.



www.dialab.at

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ / TÜRKÇE

REF Z02305DL

CE

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0408

0



PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SLOŽENÍ SOUPŘAVY

- Téhotenský test
- Příbalová informace

PRINCIP TESTU

DIALAB téhotenský test je rychlý chromatografický imunostanovení určené ke kvalitativní detekci lidského gonadotropinu (hCG) v moči jako prostředek pro včasnému prokázání téhotenství. Lidský chorony gonadotropin je glykoproteinový hormon produkovaný rozevíjecí se placentytum hned po početí. Test tento využívá kombinaci monoklonální a poliklonální protitěl k selektivnímu stanovení rostoucí hladiny hCG v moči. Test je založen na ponoření kontroly a výsledku se odečeze z vzniklých barevných čár.

UPOMINÁNÍ

Před použitím testu si pečlivě pročtěte tuto příbalovou informaci.
 • Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti.
 • Uchovávejte na suchém místě při teplotě 2 - 30 °C. Nezmražujte!
 • Nepoužívejte test, pokud je folie poškozena.
 • Uchovávejte místo dosah dětí.
 • Pro in vitro diagnostické použití.
 • Folii testu otevřete těsně před použitím.
 • Po použití zlikvidujte součásti testu v souladu s platnými předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Mož odberete do cisté a suché nádoby.
- Vymítejte z folie a prohlédnete si jej.
- Proužek ponorte po rysku MAX do moči na dobu 10 - 15 sekund. Viz obrázek.
- Proužek vymítejte a položte na novou resavou podložku.
- Vyčkejte vzniknout barevné čárky (čárek) v testovací (T) a kontrolní (C) zóně, tj. což má 3 minuty, maximálně 10 minut a porovnejte výsledek podle obrázku.

VÝSLEDEK TESTU

JSTE TÉHOTNÁ

Dva zřetelně červené proužky, jeden v testovací (T), druhý v kontrolní zóně (C).

Poznámka: Vzorky s vysokou koncentrací hCG mohou mit proužek v kontrolní zóně velmi slabý – test je v pořádku, není důležité, jak silný proužek je.

TÉHOTENSTVÍ NENÍ POTVRZENO

Ojemy se pouze jedním proužkem – v kontrolní zóně (C). Neobjeví se proužek v testovací zóně.


NEPLATNÝ VÝSLEDOK

V kontrolní zóně (C) se neobjeví žádný proužek. Může se objevit proužek v testovací zóně (T). Test je nutné opakovat s novým stripem.

LIMITACE TESTU

Existuje možnost ověření výsledku testu.

- Například léky obsahující hCG (Pregnyl, Profasi, apod.) mohou poskytovat falešně pozitivní výsledky. Naopak alkohol, antikoncepcie, antibiotika nebo hormonální lečba neobsahující hCG nemá vliv na výsledek testu.

DIALAB Téhotenský test
Pro sebekontroluREF 202306DL
CE 0408

2. Falešně pozitivní výsleky mohou způsobit také ovarální cysty nebo mimoděložní téhotenství. Výsledek testu vždy konzultujte s lékařem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

- Q: Jak test funguje?**
A: DIALAB téhotenský test detekuje v moči hormon, který vaše tělo produkuje během téhotenství (hCG-human chorionic gonadotropin). Množství tohoto hormonu v průběhu téhotenství roste.
- Q: Kdy mohu tést použít, abych zjistil téhotenství?**
A: Tento test můžete použít první den po vyněchání menstruace. Test můžete použít dokdyž během dne, ale pokud jste téhotná, ranní moči obsahuje nejvíce hormonu a je tedy nejlepší.
- Q: Mohu použít první ranní moči?**
A: Test můžete použít dokdyž během dne, ale ranní moči je nejkoncentrování, a tedy obsahuje nejvíce hormonu.

4. Q: Jak presný je tento test?

A: Klinická studie byla prováděna porováním DIALAB téhotenského testu s jiným komerčním výrobkem. K testování bylo použito 140 vzorků. Oba testy shodně prokázaly 90% pozitivních a 60% negativních výsledků. Výsledek obou testů prokázaly více než 99% přesnost tohoto testu.

5. Q: Jak citlivý je tento test?

A: DIALAB téhotenský test stanoví hladinu hCG v moči 25 mIU/ml nebo výši. Test je standardizován na WHO mezinárodní standard. Přidání LH (300 mIU/ml), FSH (1.000 mIU/ml), a TSH (1.000 mIU/ml) do negativního (0 mIU/ml) hCG a pozitivního (25 mIU/ml) hCG vzorku nebylo zjištěno ovlivnění výsledku.

- Q: Co mám dělat, pokud výsledek ukáže, že jsem téhotná?**
A: Výsledek ukazuje, že vaše moči obsahuje hCG a ještě zřejmě téhotná. Navštivte lékaře, aby vás posoudil potvrzení a prodiskutujete s ním další kroky.
- Q: Jak poznám, že test funguje dobře?**
A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

8. Q: Co mám dělat, pokud test ukáže, že nejsem téhotná?

A: Výsledek ukazuje, že nedetectoval hCG a zřejmě nejste téhotná. Pokud nezačnete do tédy po testu menstruovat, opakujte test. Jestliže je výsledek opět negativní, navštivte lékaře a prodiskutujete s ním další kroky.

9. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

10. Q: Co mám dělat, pokud test ukáže, že jsem téhotná?

A: Výsledek ukazuje, že možná jste téhotná. Pokud nezačnete do tédy po testu menstruovat, opakujte test. Jestliže je výsledek opět negativní, navštivte lékaře a prodiskutujete s ním další kroky.

11. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

12. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

13. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

14. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

15. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

16. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

17. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

18. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

19. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

20. Q: Jak poznám, že test funguje dobré?

A: Pokud se objeví barevný proužek v kontrolní (C) zóně, funguje test správně.

DIALAB Terhességi teszt
Otthoni használatraREF 202306DL
CE 0408

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / HUNGARIAN

A KÉSZLET TARTALMA

- Tesztcik
- Használati utasítás

MŰKÖDÉSI ELV

A DIALAB terhességi teszt egy gyors, egy lépésből álló, immunológiai elven működő, vizelzet tesztcik, amely az emberi chorion gonadotropin hormon (hCG) jelenlétének kimutatásával jelzi a terhességet. A tesztcikom antitestek kombinációja található, amely monoklonális hCG antitestet és tartalmaz, így a hCG hormon emelkedett szintjei széleskörűen képes kimutatni. A teszt elvezethető a csík végeit vizelelte ki martini, majd a színes csíkok alapján le kell olvasnia az eredményt.

FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, gondosan olvassa végig a használati utasítást a teszt elvezethető előtt.

- A tesztet a fólián olvasható lejárat időt követően ne használja fel.
- Száraz helyen, 20-30 °C között tárolandó. Nem fagyasztható.
- Ha a belső csomagolócsík szakadt vagy sérült, ne használja fel a tesztet.
- Gyengeséggel elszáradt tartandó.
- Csak in vitro (külső) diagnosztikai céllra. Szájba venni, jelenlegi titlos!
- Csak akkor nyissa ki a csomagolófóliát, ha készén áll a teszt megkezdésére.
- A használt tesztcikot a helyi előírásoknak megfelelően kell a hálórába dobni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Gyűjtés vizelzeteg egy tisztta, száraz pohárba vagy edénybe.
2. Vegye ki a tesztcikot a fóliából és ismerkedjen meg a termékkel.
3. A vizelzetet függőlegesen mártsa a vizelzeteghez, úgy, hogy a nyíl a vizelzet felé mutson, majd tarisa így legalább 10-15 másodpercig.
4. Gyengeséggel elszáradt tartandó.
5. Ahogy telik az idő, lehet, hogy egy halvány színű csík látható a tesztcik (T) és a kontroll sáv (C) felé. Az eredményt hármon per márvály olvasson le. Ha nem jelenik meg színes csík, várjon többi gyerek per. Néha a pozitív eredményt 1 percen belül vagy annulla hamarabb is megfigyelhető, a hCG hormon koncentrációjától függően. 10 perc után az eredmény már nem értelhető.

AZ EREDMÉNY ÉRTÉKELESE

- TERHES**
Két jól elkülöníthető színes csík jelenik meg. Az egyik csíknak a kontroll sáv (C) területén, a másiknak pedig a tesztcik (T) területén kell megjelennie. Az egyik vonal lehet, hogy halványabb, mint a másik; nem kell egyformának lenniük. Ha ilyen eredményt lát, Ón valószínűleg terhes.
- NEM TERHES**
Egy színes csík jelenik meg a kontroll sáv (C) területén. A tesztcik (T) területén nem látható csík. Ha ilyen eredményt lát, Ón valószínűleg nem terhes.

ÉRVÉNYTELEN

- Az eredmény nem értelhető, ha a kontroll sáv (C) területén nem jelenik meg csík, még akkor sem, ha a tesztcik (T) területén látható vonal. Ebben az esetben célszerű egy újabb tesztcikkal megismételni a tesztet.
- A VIZSGÁLAT ÉRTÉKELETHETŐSÉG KORTLÁTOZÓ TÉNYEZŐK**
Elvfordulhat, hogy a teszt hamis eredményt mutat. Mielőtt a teszt eredményre alapítaná bármilyen orvosi beavatkozásra vonatkozó döntést hoz, beszélje meg orvosával.
1. A hCG hormontartalmához gyógyszerek szedése (például Pregnyl, Profasi, apod.)

2. Gyenge hármon koncentrációban (pl. 25 mIU/ml)
3. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
4. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
5. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)

6. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
7. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
8. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
9. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
10. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
11. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
12. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
13. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
14. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
15. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
16. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
17. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
18. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
19. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
20. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)

21. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
22. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
23. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
24. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
25. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
26. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
27. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
28. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
29. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
30. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
31. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
32. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
33. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
34. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
35. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
36. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
37. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
38. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
39. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
40. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
41. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
42. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
43. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
44. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
45. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
46. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
47. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
48. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
49. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
50. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
51. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
52. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
53. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
54. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
55. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
56. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
57. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
58. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
59. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
60. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
61. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
62. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
63. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
64. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
65. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
66. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
67. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
68. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
69. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
70. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
71. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
72. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
73. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
74. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
75. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
76. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
77. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
78. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
79. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
80. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
81. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
82. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
83. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
84. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
85. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
86. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
87. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
88. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
89. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
90. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
91. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
92. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
93. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
94. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
95. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
96. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
97. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
98. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
99. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
100. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
101. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
102. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
103. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
104. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
105. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
106. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
107. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
108. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
109. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
110. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
111. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (pl. 1000 mIU/ml)
112. A hCG-tartalommal összhangban magas hármon koncentrációban (