



DAC-SpectroMed s.r.l.

МД-2012, Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, 47, кв. 64
Тел.: +37322/ 574900, 574922/23; факс: +37322/ 574920
Email: office@dacspectromed.com
www.dacspectromed.com

HBeAg-S-Strip-DAC

Код 4172HBe1 1 тест

РТ MD 11-15796482-005:2006

Только для диагностики «in vitro»

Хранить при 18-30°C

Тест-полоска для определение антигена вируса гепатита Ве (HBeAg) в сыворотке

ВВЕДЕНИЕ

HBeAg-S-Strip-DAC является экспресс тестом прямого связывания для визуального определения в сыворотке антигена вируса гепатита Ве (HBeAg) при диагностике гепатита В.

Одноэтапный тест основан на принципе иммунологического анализа сэндвичевого типа. Для специфического определения HBeAg используются моноклональные и поликлональные антитела (иммуноглобулины).

Чувствительность теста – 2 ng/ml.

Данный одноэтапный тест занимает по времени около 10-30 минут.

Результаты тестачитываются визуально без помощи прибора.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Индивидуально упакованная тест-полоска с влагопоглотителем.
- Инструкция

СБОР ПРОБ

Для получения сыворотки следует собрать кровь в контейнер без антикоагулянта. Оставьте кровь сворачиваться и отделите сыворотку из сгустка. Сыворотку используйте для тестирования.


Если тестирование пробы не может быть произведено в тот же день, храните пробу в холодильнике или морозильнике. Перед тестированием доведите пробы до комнатной температуры.

Не следует повторно замораживать и размораживать пробы.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ


- Перед тестированием тест устройство вместе с пробами или контролями доведите до комнатной температуры (20-30°) во избежание образования конденсата на мемbrane.
- Пользуясь иллюстрацией, погрузите тест-полоску стрелками вниз в сосуд с сывороткой примерно на 10 секунд. Не погружайте ниже отметки (*marker line*).
- Положите на чистую, сухую поверхность, не обладающую абсорбирующими свойствами.
- Инкубируйте 10 минут и считайте результаты.

Не считывать результаты по прошествии 30 минут.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Negative (отрицательный):** появляется только одна цветная линия на контрольном участке. На тестовом участке видимая линия не появляется.
- Positive (положительный):** в дополнение к контрольной линии розового цвета на тестовом участке также появляется четкая линия розового цвета.
- Invalid (недействительный):** полное отсутствие окрашивания на обоих участках является индикатором ошибки в процедуре и/или порчи реагента.



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре (18-30°C) в запечатанной упаковке до истечения срока годности.

Тест-набор следует беречь от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Только для диагностики *in vitro*.
- Не использовать тест-набор после истечения срока годности.
- Тест-устройство не следует использовать повторно.