

НАБІР ІФА

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІНТАКТНОГО ПТГ (2-Е ПОКОЛІННЯ) ТА ЦІЛЬНОГО ПТГ (3-Є ПОКОЛІННЯ)

10025-300, Parathyroid Hormone, Whole (3rd Generation) & Intact (2nd Generation) (PTH Whole & Intact) Test System

Каталог. №: 10025-300

Дата випуску інструкції: 25-04-2018

Кількість : 96

Версія 0

Виробник : Monobind Inc., (США)



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

1.0 ВВЕДЕННЯ

Призначення використання: Кількісне визначення концентрації інтактного ПТГ (2-е покоління) та цільного ПТГ (3-е покоління) у сироватці або плазмі людини за допомогою мікропланшетного ферментного імуноаналізу, колориметричного.


2.0 ВСТУП (Див. оригінал інструкції).

3.0 ПРИНЦІП МЕТОДУ

Метод рівноваги типу сендвіч (Тип 2):

Основні реагенти, необхідні для імуноферментного аналізу, включають антитіла високої спорідненості та специфічності (ферментні та іммобілізовані) з різним і чітким розпізнаванням епітолів, **у надлишку**, та нативний антиген. У цій процедурі іммобілізація відбувається під час аналізу на поверхні мікропланшетних лунок через взаємодію антитіла х-PTH (C-кінцевий епітоп), нанесеного в лунку.

При змішуванні міченого ферментом антитіла (N-кінцевий епітоп) та сироватки, що містить нативний антиген, відбувається реакція між нативним антигеном та антитілами, без конкуренції та стеричних перешкод, з утворенням сендвіч-комплексу. Взаємодія ілюструється наступним рівнянням:



Ab_(well) = Антитіло нанесене в лунці (надмірна кількість)

Ag_{PTH} = Нативний антиген (змінна кількість)

EnzAb = Помічене ферментами антитіло (надмірна кількість)

EnzAb - Ag_{PTH} - Ab_(well) = Сендвіч-комплекс Антиген-антитіла

k_a = константа швидкості асоціації

k_{-a} = константа швидкості дисоціації

Через достатній час фракція, пов'язана з антитілами, відокремлюється від незв'язаного антигену декантациєю або аспірацією. Активність ферментів у фракції, пов'язаній з антитілами, прямо пропорційна концентрації нативного антигену. За допомогою декількох різних сироваткових референсних матеріалів з відомими значеннями антигену може бути сформована крива реакції на дозу, з якої можна встановити концентрацію невідомого антигену.

4.0 РЕАГЕНТИ

Матеріали, що постачаються:

A. Калібратор ПТГ – 1.0 мл/флакон (ліофілізований)

Шість (6) флаконів референсного матеріалу для ПТГ на рівнях 0 (A), 15 (B), 75 (C), 150 (D), 500 (E) та 1000 (F) пг/мл. Зберігати при температурі 2-8 °C.

Розбавте кожен флакон з 1.0 мл дистильованої або деіонізованої води. Відновлені калібратори стабільні протягом 24-48 годин при 2-8 °C.Щоб зберігати протягом тривалого періоду, аліквотуйте відновлені

калібратори у кріо-флакони та зберігайте при -20 °C. **НЕ ЗАМОРОЖУЙТЕ/ ВІДТАВАЙТЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ДВА РАЗИ.** Додано консервант.

Примітка: Калібратори на основі людської сироватки можна простежити за стандартом ВООЗ Перший IS 95/646.

B. Контроль ПТГ – 1.0 мл/флакон (ліофілізований)

Два (2) флакони референсних контролів для ПТГ. Зберігати при температурі 2-8 °C. **Розбавте кожен флакон з 1.0 мл дистильованої або деіонізованої води.** Відновлені калібратори стабільні протягом 24-48 годин при 2-8 °C. Щоб зберігати протягом тривалого періоду, аліквотуйте відновлені калібратори у кріо-флакони та зберігайте при -20 °C. **НЕ ЗАМОРОЖУЙТЕ/ ВІДТАВАЙТЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ДВА РАЗИ.** Додано консервант.

C. Ферментний реагент ПТГ 2-го покоління - 6 мл/флакон

Один (1) флакон містить реагент кон'югату анти-ПТГ. Зберігати при температурі 2-8 °C.

D. Ферментний реагент ПТГ 3-го покоління - 6 мл/флакон

Один (1) флакон містить реагент кон'югату анти-ПТГ. Зберігати при температурі 2-8 °C.

E. Пластина, покрита антитілами до ПТГ - 96 лунок

Один 96-лунковий мікропланшет, покритий антитілом х-PTH. Зберігати при температурі 2-8 °C.

F. Концентрат промивного розчину (20x) - 20 мл/флакон

Один (1) флакон містить ПАР у забуференому сольовому розчині. Додано консервант. Зберігати при температурі 2-8 °C. Див. розділ Приготування реагенту.

G. Реагент субстрату - 12 мл/флакон

Один (1) флакон містить у буфері тетраметилбензидин (TMB) та пероксид водню (H₂O₂). Зберігати при температурі 2-8 °C.

H. Стоп-розвчин - 8 мл/флакон

Один (1) флакон містить сильну кислоту (H₂SO₄). Зберігати при температурі 2-8 °C.

I. Інструкція щодо виробу.

Примітка 1: Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності набору.

Примітка 2: Не піддавайте реактиви впливу тепла, сонця або сильного світла.

Примітка 3: Вищевказані компоненти призначенні для одного 96-лункового мікропланшету.

4.1 Необхідні матеріали, які не поставляються з набором

1. Піпетка здатна подавати обсяги 0.50 мл (50 мкл) та 0.100 мл (100 мкл) з точністю, що перевищує 1.5%.
2. Дозатор (і) для повторних подач об'ємом 0.100 мл (100 мкл) та 0.350 мл (350 мкл) з точністю, що перевишує 1.5%.
3. Мікропланшетний вошер або гнучка пляшка (опційно).
4. Мікропланшетний рідер з фільтрами 450 нм і 620 нм.
5. Фільтрувальний папір для висушування мікролунок.
6. Пластикова пілівка або кришка для інкубування мікропланшетів.
7. Вакуумний аспіратор для промивання (опційно).
8. Таймер.
9. Контрольні матеріали.

5.0 ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Набір призначений тільки для діагностики in-vitro

*Не для внутрішнього або зовнішнього використання
на людях або тваринах*

Всі продукти, що містять сироватку, протестовані методами, схваленими FDA, в яких отримані негативні результати на наявність антитіл до ВІЛ 1 та 2, HCV і поверхневого антигену гепатиту В. Однак, оскільки не існує методів, що дають повну гарантію відсутності інфекційних агентів, з реагентами слід поводитися з обережністю, як з потенційно небезпечним біоматеріалом, що рекомендується для будь-яких зразків крові згідно правил кваліфікованої лабораторної практики. Рекомендації дивіться в національних посібниках з біобезпеки або, наприклад, в "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories," 2nd Edition, 1988, HHS.

Безпечна утилізація компонентів набору повинна відповідати вимогам місцевої регуляторної та нормативної бази.

6.0 ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ

Зразками повинна бути сироватка або плазма ЕДТА за типом, і слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів при заборі зразків венепункцією. Для точного порівняння із встановленими нормальними значеннями слід отримати зразки сироватки вранці натще. Кров слід збирати в звичайну пробірку для венепункції без додатків або антикоагулянтів для сироватки або в пробірки, що містять ЕДТА, для плазми. Дайте крові згуститися для зразків сироватки. Центрифугуйте зразок, щоб відокремити сироватку або плазму від клітин.

Якщо зразок (и) неможливо аналізувати одразу після забору крові, зразок (зразки) може зберігатися при температурі -20 °C до 30 днів. Уникайте використання забруднених пристрій. Уникайте повторного заморожування та розморожування (максимум два цикли заморожування/відтавання перед використанням). Для аналізу у двох примірниках потрібно 0.100 мл (100 мкл) зразка.

7.0 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Кожна лабораторія повинна проводити аналіз контролю на рівнях у низькому, нормальному та підвищенню діапазоні для моніторингу результатів аналізу. Ці контролі повинні досліджуватися як невідомі зразки в кожній постановці аналізу. Повинні будуватися карти контролю якості для відстеження характеристик реагентів, що поставляються. Слід застосовувати прийнятні статистичні методи для встановлення відхилень. Значні відхилення від встановлених характеристик можуть свідчити про зміни в умовах експерименту або зниження якості реагентів набору. Для визначення причини змін повинні бути використані свіжі реагенти.

8.0 ПРИГОТОУВАННЯ РЕАГЕНТИВ

1. Промивний розчин

Розбавте концентрат розчину для промивання до 1000 мл дистильованою або деіонізованою водою у відповідному контейнері для зберігання. Зберігайте при кімнатній температурі (2-30 °C) до 60 днів.

Примітка: Не використовуйте реагенти, які забруднені або мають бактеріальний ріст.

9.0 ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

Перед початком аналізу всі реагенти, сироваткові референсні калібратори і контролі повинні досягти кімнатної температури (20-27 °C).

Процедура тестування повинна проводитись кваліфікованим фахівцем

1. Відформатуйте лунки мікропланшетів для кожного сироваткового референсного матеріалу, контролю та зразка пацієнта для аналізу у двох примірниках. Поверніть невикористані смужки назад в алюмініевий пакет, закрійте та зберігайте при температурі 2-8 °C.
2. Внесіть 0.050 мл (50 мкл) відповідного сироваткового референсного матеріалу, контролю або зразка у призначну лунку.

ДЛЯ 2-го Покоління

3. Додайте 0.050 мл (50 мкл) ферментного реагенту х-ПТГ 2-го покоління в кожну лунку. Дуже важливо розподілити всі реагенти поблизу dna лунки з покриттям.
4. Обережно обертайте мікропланшет протягом 20-30 секунд, закрійте та інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі.

АБО 3-го Покоління

3. Додайте 0.050 мл (50 мкл) ферментного реагенту х-ПТГ 3-го покоління в кожну лунку. Дуже важливо розподілити всі реагенти поблизу dna лунки з покриттям.
4. Обережно обертайте мікропланшет протягом 20-30 секунд, закрійте та інкубуйте протягом 75 хвилин (1 год 15 хв) при кімнатній температурі, використовуючи шейкер для пластин при 150-200 об/хв або протягом двох (2) годин без струшування.

5. Видаліть вміст мікропланшути шляхом декантації або аспірації. Якщо це декантація, постукайте та протріть пластину насухо абсорбуючим папером.

6. Додайте 350 мкл промивного буфера (див. розділ "Приготування реагентів") і видаліть його. Повторіть процедуру ще два рази (загальна кількість циклів промивки - 3). Для цієї процедури краще використовувати автоматичний або ручний вошер відповідно до інструкцій виробника приладів. Якщо використовується гнутика пляшка, наповнити кожну лунку до верху (унікайте повітряних бульбашок). Видаліть вміст і повторіть ще 2 рази.

7. Додайте 0.100 мл (100 мкл) робочого розчину субстрату у всі лунки (див. Розділ «Підготовка реагенту»). Завжди додайте реагенти в однаковому порядку, щоб мінімізувати різницю в часі реакції між лунками.

НЕ СТРУШУЙТЕ ПЛАНШЕТ ПІСЛЯ ДОБАВЛЕННЯ СУБСТРАТУ

8. Інкубуйте при кімнатній температурі протягом двадцяти (20) хвилин.
9. Додайте 0.050 мл (50 мкл) стоп-розвину в кожну лунку та обережно перемішуйте протягом 15-20 секунд. Завжди додавайте реагент в однаковому порядку, щоб мінімізувати різницю в часі реакції між лунками.
10. Вимірюйте величини поглинання вмісту лунок на довжині хвилі 450 нм (вимірювання проводити при референсній довжині хвилі 630 нм). Виміри повинні бути проведені протягом 15 хвилин після додавання стоп-розвину.

Примітка: Для повторного аналізу зразків з концентрацією більше 1000 пг/мл слід проводити розведення сироватки або плазми людини з низькими значеннями ПТГ і відповідно множити.

10.0 РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

Для визначення концентрації ПТГ в невідомих зразках використовується калібрувальна крива.

1. Відкладіть значення поглинання для кожного сироваткового референсного матеріалу в дублях відповідно до концентрації ПТГ в пг/мл на лінійному міліметровому папері (перед тим, як складати графік, не слід усереднювати дублікати референсного матеріалу сироватки).
2. Накресліть криву, яка найкраще підходить, через побудовані точки.
3. Щоб визначити концентрацію ПТГ для невідомого, знайдіть середнє поглинання дублікатів для кожного невідомого на вертикальній осі графіка, знайдіть точку перетину на кривій і зчитуйте концентрацію (у пг/мл) з горизонтальної вісі графіка (дублікати невідомого можуть бути усереднені, як зазначено). У наступному прикладі для ПТГ 2-го Покоління середня аборсція (1800) перетинає криву реакції на дозу при концентрації ПТГ 419 пг/мл (див. Малюнок 1). Для ПТГ 3-го Покоління середня аборсція (0.265) перетинає криву реакції на дозу при концентрації ПТГ 78.5 пг/мл (див. Малюнок 2).


Примітка: Комп'ютерне програмне забезпечення для аналізу даних, розроблене для аналізів ELISA, також може використовуватися. Якщо таке програмне забезпечення використовується, слід виконати його перевірку.

ПРИКЛАД 1 (2-ге Покоління)

I.D. зразка	Номер лунки	Abs (A)	Середнє Abs (B)	Значення (пг/мл)
Cal A	A1	0.013	0.015	0
	B1	0.017		
Cal B	C1	0.082	0.091	15
	D1	0.106		
Cal C	E1	0.370	0.357	75
	F1	0.355		
Cal D	G1	0.677	0.657	150
	H1	0.647		
Cal E	A2	2.103	2.079	500
	B2	2.065		
Cal F	C2	3.265	3.308	1000
	D2	3.360		
Пацієнт	E2	1.801	1.800	419
	F2	1.800		

*Дані, наведені в прикладі 1 та на малюнку 1, служать лише для ілюстрації і **не повинні** використовуватися замість кривої реакції на дозу, підготовленої для кожного аналізу.

Малюнок 1 (2-ге Покоління)




*Якщо показник поглинання не відповідає шкалі або перевищує середнє поглинання найвищого калібратора, зразок слід повторити з розведенням.

ПРИКЛАД 2 (3-те Покоління)

I.D. зразка	Номер луники	Abs (A)	Середнє Abs (B)	Значення (пг/мл)
Cal A	A1	0.030	0.030	0
	B1	0.030		
Cal B	C1	0.084	0.083	15
	D1	0.082		
Cal C	E1	0.260	0.255	75
	F1	0.250		
Cal D	G1	0.491	0.492	150
	H1	0.493		
Cal E	A2	1.495	1.490	500
	B2	1.486		
Cal F	C2	2.781	2.713	1000
	D2	2.646		
Пациєнт	E2	0.260	0.265	78.5
	F2	0.270		

*Дані, наведені в прикладі 2 та на малюнку 2, служать лише для ілюстрації і не повинні використовуватися замість кривої реакції на дозу, підготовленої для кожного аналізу.

Малюнок 2 (З-те Покоління)



*Якщо показник поглинання не відповідає шкалі або перевищує середнє поглинання найвищого калібратора, зразок слід повторити з розведенням.

11.0 ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Результати аналізу можна вважати достовірними, якщо дотримуються наступні умови:

1. Максимальна Оптична щільність (Калібратор «F») ≥ 1.2
 2. Чотири з шести контрольних пулів повинні укладатися у встановлені інтервали.

12.0 АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Форма MSDS та аналізу ризиків для цього продукту доступна за запитом від Monobind Inc.

12.1. Якість роботи набору

- Для відтворюваності результатів важливо, щоб час реакції підтримувався постійним в кожній лунці.
 - Піпетування зразків не повинно перевищувати 10 хвилин.
 - Не використовувати високо ліпемічні, гемолізовані або забруднені зразки.
 - Якщо використовується більше, ніж один планшет, рекомендується повторювати калібрувальну криву.
 - Додавання субстратного розчину ініціє кінетичну реакцію, яка зупиняється при додаванні стоп-розчину. Отже, додавання субстрату і стоп-розчину повинно проводитися в однаковій послідовності для усунення відмінностей у часі реакції в різних лунках.
 - Вимірювання оптичної щільноти на рідлері проходить вертикально. Не торкайтесь до dna мікролунок.
 - Погана промивка лунок (неповне видалення розчину під час аспірації) може призводити до невідтворюваних і недостовірних результатів.
 - Використовуйте компоненти тільки з одного лота. Не змішуйте реагенти з різних партій.
 - Правильне і точне піпетування, а також дотримання точного часу і температурних вимог є необхідними умовами. Будь-які відхилення від становлених Monopbind можуть давати невірні результати.
 - Дотримуватись всіх встановлених норм роботи лабораторної практики для забезпечення нормальній роботи пристрою.
 - Важливим є калібрування всього обладнання, тобто, піпеток, рідера, вощера та/або автоматизованих інструментів, які використовуються з Monopbind.

даним пристроєм. Також обов'язковим є належний догляд і обслуговування пристрою.

12. Аналіз ризиків - згідно з вимогами Директиви 98/79/ЄС IV Маркування IVD - для цього та інших пристройів, виготовлених Monobind, можна надіслати запит електронною поштою з Monobind@monobind.com.

12.2 Інтерпретація результатів

- Вимірювання та інтерпретація результатів повинні проводитись досвідченими професіоналами.**
 - Лабораторні результати не можуть бути єдиним критерієм для визначення лікування, особливо, якщо отримані результати не співпадають з іншими дослідженнями.
 - Для дійсних результатів випробувань адекватні засоби контролю та інші параметри повинні відповідати переліченим діапазонам та вимогам до аналізу.
 - Monobind не несе відповідальності** за результати тесту в разі, якщо складові набору були замінені іншими складовими з інших наборів, або якщо результати були інтерпретовані невірно.
 - Якщо для обробки результатів тесту використовується комп'ютер, то розраховані значення стандартів не повинні відхилятися більш, ніж на 10% від приписаних значень концентрації.
 - Реагенти для процедур тестової системи були сформульовані для усунення максимальних перешкод; однак, потенційна взаємодія між рідкісними зразками сироватки та випробувальними реагентами може привести до помилкових результатів. Гетерофільні антитіла часто викликають ці взаємодії і, як відомо, є проблемами для всіх видів імунологічних аналізів (Boscato LM, Stuart MC. "Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays" Clin.Chem. 1988: 3427-33). Для діагностичних цілей результати цього аналізу повинні використовуватися в комбінації з клінічним оглядом, історією хвороби та всіма іншими клінічними висновками.

13.0 ОЧІКУВАНІ ДІАПАЗОНИ ЗНАЧЕНЬ

Рівень інтактного ПТГ вимірювали у п'ятдесяти восьми (58), очевидно, нормальних людей. Отримані значення коливались від 9.0 до 94 пг/мл. На основі статистичних тестів на зміщення та ексцес, популяція, перетворюючись логарифмічно, дотримується нормального або Гауссового розподілу, як показано на гістограмах. Середнє геометричне значення ± 2 стандартних відхилення середнього значення було підраховано від 10.4 до 66.5 пг/мл. Важливо мати у увазі, що встановлення діапазону значень, які можна очікувати за певним методом для сукупності "нормальних" людей, залежить від безлічі факторів: специфіки методу, тестованої популяції і точності методу в руках аналітика. З цих причин кожна лабораторія повинна залежати від діапазону очікуваних значень, встановлених виробником, до тих пір, поки аналітики не зможуть визначити внутрішній діапазон, використовуючи метод із популяцією, корінною для району, в якому розташована лабораторія.

14.0 СПЕЦИФІЧНІСТЬ

Наступні фрагменти ПТГ були протестовані і виявлено, що вони не реагують.

2-ге Покоління

Пептид	Концентрація (пг/мл)	% Реакційна здатність
1-34 фрагмент	100 000	0.001
1-44 фрагмент	100 000	0.005
7-34 фрагмент	100 000	0.002

3-тє Покоління

Пептид	Концентрація (пг/мл)	% Реакційна здатність
1-34 фрагмент	100 000	0.001
1-44 фрагмент	100 000	0.005
7-34 фрагмент	100 000	0.002
7-84 фрагмент	100 000	0.003



Monobind, Inc.
100 North Pointe Drive
Lake Forest, CA 92630

Tel: 949.951.2665 Fax: 949.951.3539 www.monobind.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

